

คำแนะนำ: สำหรับผู้เดินทาง/นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด

จากข้อมูลที่มีในปัจจุบัน พบว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะมี อาการป่วยรุนแรง ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง โรคไตวาย หรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง

ไปในประเทศที่มีการระบาดในช่วงที่มีการระบาดของโรค สำหรับผู้เดินทางทั่วไป ควรปฏิบัติตน ดังนี้

1. หากไม่จำเป็น ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปใน สถานพยาบาล ในช่วงที่มีการระบาดของโรค
2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระบบ ทางเดินหายใจ หรือผู้ที่มีอาการไอหรือจาม
3. หลีกเลี่ยงการเข้าไปหรือสัมผัสสัตว์เลี้ยง หรือ สัตว์ป่าต่างๆ หรือตม่น้ำนมดิบ โดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะน้ำนมอูฐ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรังโรคของเชื้อได้
4. ปฏิบัติตามสุขอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ด้วย น้ำและสบู่
5. ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ควรหลีกเลี่ยง การสัมผัสคลุกคลีกับบุคคลอื่น เพื่อลดการแพร่ กระจายเชื้อ เมื่อไอหรือจามควรใช้กระดาษชำระปิดปาก และจมูกทุกครั้ง และทิ้งกระดาษชำระที่ใช้แล้วลงใน ถังขยะที่ปิดมิดชิดและล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ควรไอหรือจามลง บนเสื้อผ้าบริเวณต้นแขน ไม่ควรจามรดมือและรีบไป พบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่
6. หลังจากกลับจากการเดินทาง หากภายใน 14 วัน มีอาการไข้ ไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือโทร.

1669 พร้อมแจ้งประวัติ การเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

อาคาร 8 ชั้น 4 ตึกราชประชาสมาสัย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



โทร.0 2590 3159 โทรสาร.0 2590 3238

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก
หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
รีบพบแพทย์ทันที
พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง



โรคทางเดินหายใจ ตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome : MERS)



โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง Middle East Respiratory Syndrome: MERS หรือโรคเมอร์ส หรือชื่อเต็ม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 เป็นเชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรนา (MERS Corona Virus :MERS CoV) ขณะนี้พบว่า การระบาดส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลางและล่าสุด มีการระบาดที่เกาหลีใต้ ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจำกัด ซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วยด้วยกันหลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลใกล้ชิด สมาชิกครอบครัวเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง

ประเทศไทยได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มข้น โดยเน้นหนักในการค้นหาผู้ป่วยที่สถานพยาบาล การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคเมอร์สที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด และมีความเสี่ยงที่อาจพบการระบาดในประเทศได้เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ โดยผ่านผู้เดินทางไปมาระหว่างประเทศที่มีการระบาดของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้เดินทางไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบียและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาในประเทศแถบตะวันออกกลางและสาธารณรัฐเกาหลีและเนื่องจากโรคเมอร์ส สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย จากการไอ จาม ของผู้ป่วย รวมทั้งการสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรค เช่น อูฐ

อาการของโรค

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ MERS CoV บางรายไม่มีอาการ บางรายมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางราย จะมีอาการในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ท้องร่วง ร่วมด้วย และบางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจรุนแรง และถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ป่วยที่อาการรุนแรง อาจทำให้

เกิดระบบทางเดินหายใจล้มเหลว โดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง หายใจหอบ และหายใจลำบาก ปอดบวม ซึ่งในงานวิจัยผู้ป่วยทั้งหมด พบว่าจะมีรายงานจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต ร้อยละ 30-40 ส่วนในผู้ที่มีโรคประจำตัวซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ ลดน้อยลง การแสดงของโรคอาจมีความแตกต่างออกไป

ระยะฟักตัวของโรค

มีระยะฟักตัว 2-14 วัน



วิธีการแพร่โรค

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2014 พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบางรายไม่มีรายงานการยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ล่าสุดมีการระบาดในประเทศแถบเอเชีย ซึ่งมีรายงานการติดเชื้อจากคนสู่คนในวงจำกัด ซึ่งพบในกลุ่มผู้ป่วย

ด้วยกัน หลายกลุ่ม ได้แก่ ผู้ดูแลใกล้ชิด สมาชิกครอบครัว
เดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังไม่มีการแพร่กระจายเชื้อ
ในวงกว้าง สำหรับการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน สามารถแพร่
ผ่านทางละอองฝอยของผู้ป่วยจากการไอ เป็นต้น และมักเกิด
จากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยมิได้มีการป้องกันตนเอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ในบางรายมีประวัติ
สัมผัสกับสัตว์และดื่มน้ำนมดิบจากสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
อูฐ

การรักษา

เป็นการรักษาตามอาการแบบประคับประคอง ยังไม่มีวัคซีน
และยารักษาที่จำเพาะ

